

IOANNIS BAPTISTÆ  
COMITIS A COVOLO  
PHILOSOPHI, AC MEDICI

*Nec non*

Academiæ Botan. Florent., & Instituti  
Bononiensis Socii

*De Metamorphosi duorum ossium  
pedis in quadrupedibus  
aliquot.*

---

---

BONONIÆ

\*\*\*\*\*  
Ex Typographia Lælii a Vulpe.

MDCCLXV.

*Superiorum auctoritate.*

ANNALS OF THE

CONSTITUTIONAL

REPUBLICAN PARTY

OF THE STATE OF NEW YORK  
FOR THE YEAR 1851

ALBANY: PUBLISHED BY  
J. B. RILEY, AT THE  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.

1851.

NEW YORK:

W. H. BROWN, 10 NASSAU ST.

AND J. B. RILEY, 10 NASSAU ST.

AT THE OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.



ANGELO QUIRINO

SENATORI AMPLISSIMO.

JO. BAPTISTA A COVOLO  
F.


Quem ego in celeberrima Bononiensis Instituti Scientiarum Academia sermonem nuper habui ,  
eum nunc edo præclaro Nomine Tuo  
exornatum , Vir Nobilissime. Sermo  
autem est de peculiari duorum officium  
me-

metamorphosi quam ob eximium ar-  
dorem illum quo inter graviora stu-  
dia res quasque naturales profequi  
soles, Te pariter spero non illibente  
consideraturum . Id vero munuscu-  
lum quod Tibi fisto quamvis exiguum  
sit & tenuissimum , pro animi Tu-  
magnitudine & benignitate æqui bo-  
nique confule, mihi que ac studi-  
meis ut hactenus impense fecisti hu-  
maniter fave.













I  
**E**st animantium corpus innumeris constructum partibus, supra quam dici possit subtilissimo opere contextis, tantaque sapientia dispositis & per accommodata vincula inter se colligatis, ut earum quæque cæteris omni-  
us communiter & famuletur & indigeat. Cum autem memoratarum partium pleræque inter se plurimum differant non modo quoad variam, & fibrarum, & vasorum, & aliorum componentium dispositionem, verum etiam ob diversum ductui, & mollitudinis, & flexibilitatis gradum, ex eo fit ut signes dum vivimus multiplicesque vices patiantur universæ animantis partes, propter varias earum vires, & potentias, resistentias, quibus invicem agunt. Quarum quidem virium potentiarumque actio quamquam jugis sit & perpetua, major tamen sit oportet a prima foetus formatione ad animalis ordinem, & multo major ab ortu ad summum usque corporis incrementum.

Cæterum inter vicissitudines, quæ ex aliarum in alias ratione singulis partibus accidunt, eæ facile præcipuam merentur considerationem, quas subeunt ossa; hæc enim cæterarum partium durissima cum sint, propriamque tam belle in seletis retineant formam, ossa cum ossibus comparare non facile possumus, eorumque pro varia ætate mutationes diligentiori examine perscrutari. Et sane in infantibus recensis maturoque tempore editis tenella ossa simplicem, ut ita dicam, sui incrementi gradum attigerunt; nam quæ ad illos artus pertinent, figuram habent fere teretem, cætera vero corpusculi ossa vix aliquam scabritiem inæqualitatemque præferunt: sed pro eo ut corpus magnitudine, & robore semper augetur, atque suis partibus magis in dies magisque vitæ munera utitur, ossa paullatim mutantur, duriora fiunt,  
no-



novamque omnino assumunt formam fulcis, futuris, tuberibus ultro citroque exasperatam, ossaque ipsa cum nonnullis ossibus coalescunt. Atque hæc quidem varietates ossium, & progressus jam ab excellentissimis Anatomicis fuerunt sine minus omnia, certe pleraque animadversa literisque consignata.

Verum singularem illam vicem, quam in bobus, & ovibus, & aliquot aliis quadrupedum speciebus subit os, quod Galli *le canon* vocant, quodque, ni fallor, ossibus nostri metatarsi, & metacarpi, sive ejus locum, sive figuram spectat, respondet, nemo ante Clarissimum Foucherousium, quod sciam observavit. Resque est profecto digna, quæ peculiariter animadvertatur.

Itaque observavit Clar. Foucherousius in eorum animalium foetibus os modo indicatum sub prima formationis tempore ex duobus distinctissimis veruntamen se se tangentibus ossibus suo singulis periosteo obvolutis constare: tum paucis post hebdomadis hæc bina ossa simul concreescere, ut tandem in adolescentibus vitulis & agnis unicum sit os, illudque in duas partes vitales septo satis conspicuo divisum. Afferitque ossescere huius ossis epiphyyses in ipso utero, atque ita cum ossibus conjungi, ut in natis integræ amplius separari non possint. Septem deinceps, quod nominavimus, magis magisque attenuari animadvertit, & brevi reticulatum fieri; denique penitus deleri, cum animal ad ultimum incrementi gradum pervenerit, nihil quidquam in ejus ossis cavitate relinquatur, quod tantæ commutationis indicium esse possit, si excipiatur sulcus profundus qui in externa ossis facie secundum longitudinem remanet unionis quam diximus vestigium.

Atque hæc fere sunt, quæ Foucherousius in eum sermonem contulit, quem nuperrime ad celebrem hanc Academiam interfuit, cujus ad calcem addit, dissimulare se non posse, quod sibi gratum fuisset intelligere, cui bono voluerit natura, ex duobus unum os efficeretur, quæve id ratione eveniat; tunc enim obscurum id sibi plane esse, & præsertim quomodo septum, quod ante memoravimus, primum gracilescere postea penitus oblitteretur.

Cum autem gratum pariter tibi, Clar. Præses, vobisque Academici spectatissimi, futurum senserim, si quis in eandem rem inquireret, Foucherousii observationes quascumque peroravi, & rem ipsam mechanice meliori quo possem modo



aggressus sum explicare. Atque vos rogo ut primum hunc meum vestra causa susceptum levem quidem, sed mihi certe jucundum laborem, tanquam aliquam mei in vos grati animi significationem excipere velitis, qui me summo celeberrimæ vestræ Societatis honore exornastis.

Meis igitur observationibus agnos persecutus sum, sed eos non nisi ab illo tempore, quo in lucem eduntur, ad illam usque ætatem, quæ summum ipsis affert incrementum. Foetus in promptu non habui, neque in angustissimo septem dierum spatio in natis ipsis singulos ætatis gradus nisi intercisa serie comparare mihi potui. Id tamen rei, quam quærimus, nihil quidquam officit, uti mox intelligetis. Quo vero major meis observationibus fides haberetur, ipsas quas feci præparaciones huc attuli.

Quarum duæ, quæ litera A designantur (*vide Fig. A*), referunt bina ossa decerpta ex agno duodecim horas nato, ac nondum, nec lacte quidem, pasto. Atque hic quidem apparent ossa duo primigenia, quæ summa primum diligentia postea nullo negotio diduxi. Ex quo profecto intelligitis illud verum non esse, quod intra matris alvum eadem duo ossa in unum coalescant os septo partitum, sed adhuc distincta permanere quamvis contactu arctissimo conjuncta. Reticendum tamen non est, periosteon, qua parte se tangunt ossa, tenuissimum esse, quemadmodum ipsorum quoque ossium parietes ubi loci, præsertim in medio, nonnihil tenuiores apparere.

Officulum litera B (*Fig. B*) signatum ad agnum pertinebat nescio quot dies natum sed certe paucos. Id pariter non sine anatomica industria fere totum in duo diducere mihi contigit, quamvis laminarum, quæ septum constituunt, portio unius alteri in diductione adhæserit. Post id tempus laminarum (*Fig. C*) coalitus, & tenuitas usque adeo major fit ut non secus ac talci foliolum transpareant, & quacumque adhibita diligentia & arte separari non amplius possint; quin etiam brevi incipit septum foraminulis refertum apparere ut cribri speciem referat, idque in media tantummodo ossis parte, ut videre est in præparatione, quam litera C (*Fig. D*) insignivi. Foraminula hæc magis magisque deinceps ampla fiunt, ut in subtilissima tandem abeant filamenta. Cum autem magnus jam aries factus est, non sine admiratione vidi ego restare utique adhuc in ejus ossibus septum, in media tamen ossis



ossis parte deficiens, sed non omnino, conspicuum enim eo loci vestigium semper superest, hinc scilicet ossea spina, illinc tantula prominentia. Observate præparationem litera D (*Fig. E*) signatam. Atque hæc ad interiora ossis pertinent.

Quod ad exteriora spectat, si de pede anteriori loquamur, in postica parte conspicitur fulcus ab ossis medio ad superiora sat profundus; in antica vero, quæ tota convexa est, observatur ossium conjunctionis vestigium, idque minimum, & tantum versus ossis ipsius extrema. Sed in pede posteriori formam fere quadratam refert os, binique in eo occurrunt fulci alter anterior, posterior alter, uterque superficie tenus leviter insculptus. In agni tamen recens nati ossiculis nullum fulcum offendi, sed levem tantum lineam utrinque insculptam: ut propterea mihi videantur fulci illi a circumpositis partibus deinceps eo modo conformari, quo in cranio ab arteriis fulci conformantur.

Quod vero ad epiphygium coalitum attinet, eas nullo labore in his omnibus omnino, quæ in examen revocavi, agnorum ossibus integras disjuxi periosteo tantum antea diligenter separato, imo idem effeci vel in ipsis arietum ossibus, quamquam non sine aliqua vi: veluti in præparationibus litera E (*Fig. FFF*) designatis conspicitur.

Post has observationes, quæ non parum ab iis distant, quas Clar. Fougereus Academiae proposuit, non abs re alienum esse mihi videtur, si vobiscum communicavero, me in istorum ossium examine ne minimum quidem periostei indicium os inter & epiphygium potuisse unquam cognoscere.

Agite nunc, conjecturas, quas feci dum phænomenon hocce attente persequerer, benigne excipite.

Et primum quidem animadverto bina hæc ossa, de quarum conjunctione quæstio est, in utero materno, & extra partem inter se habere magnitudinem & figuram; atque ea parte, qua se respiciunt, in planam desinere superficiem. Quod vero ossium reliquum est ad cylindricam figuram quam proxime accedit, exceptis extremitatibus, quæ ut in cæteris hujusmodi ossibus nonnihil crassescunt. Eorum ossium unum externum est, internum alterum, inter se parallela, & secundum longitudinem se mutuo tangunt. Utriusque ossis caput cum ossibus committitur nostro & carpo, & tarso respondentibus: in basi vero adjunctas habent epiphyfes unumquodque suam,



3

am, quæ sibi pariter adhærent, & utraque in trochleæ spe-  
em pulcherrime terminatur. Per has autem trochleas utrum-  
ue os cum ossibus, ut opinor, phalangium articulo firma-  
r. Quam ob rem naturaliter sic posita sunt hæc ossa, ut a  
posterioribus ad anteriora oblique descendant. Per mediam  
ero eorum partem anteriorem aliquot validissimi tendines  
currunt, multoque plures per posteriorem, suis singuli va-  
nis inclusi multa cellulari tela obductis. Hi tendines tendi-  
bus respondent musculorum, qui in nobis digitos flectunt,  
que extendunt. Omnia autem hæc in hisce bestiolis etiam  
cens natis, pelle fatis firma & robusta circumambiuntur.

Vix solis lumina exorti visunt agni, adhuc maternæ al-  
humoribus madentes jam pedibus innituntur, ambulant;  
matrem norunt & quocumque sequuntur; vel lactentes sub  
matre gestiunt, & hinc illinc læta pabula perfultant, nec  
periculis parcunt; multo aliter ac nobis hominibus accidit, qui  
ollissimo corpore atque infirmo nascimur, primamque vi-  
am trahimus omnium rerum inscii vagitus lugubres inter &  
mnum.

Jam vero his præmissis facile crediderim intus in utero  
a ossicula pati nihil aliud, nisi ut contigua cum sint &  
parallela, & instar argillæ mollia, alterum alteri se accommo-  
nt quo primum tempore evolvuntur, unde binæ illæ, quas  
pra memoravimus, planæ superficies exoriantur, atque ex  
fortasse parietes ad eam partem aliquantulum subtiliores  
adant.

Nunc autem quis non videt agno vix nixibus ex alvo  
matris egresso, ex tot ejus motibus & saltationibus ossa, de  
quibus agimus, validam compressionem perferre, ejusque com-  
pressionis effectum fere totum in illam ossium superficiem ca-  
te, qua se mutuo tangunt? Tum enim præter totius corpo-  
pondus, quod iisdem ossibus incumbit oblique positis, in-  
nescent musculi & tenditur fortiter pellis, qua sic tensa,  
maxima tendinum, quos memoravimus, potentia insuper  
addita, fatis jam virium esse intelligitis, ex quibus utrumque  
valide fortiterque constringatur, atque aliud contra aliud  
æctim adigatur, adeo ut ex diuturna compressione modo  
majori, modo minori, jam os cum osse ita coalescat ut ex  
duobus unum os fiat.

Quin etiam illa compressione, de qua loquimur, necesse  
est



est ut vascula sanguifera, quæ per medias eorum ossium fi-  
 excurrunt, materiem iisdem afferentia, ex qua incremen-  
 & duritiem accipiant, strictim veluti in torculari agan-  
 sicque interjecto septo maxima parte sin minus omnes  
 ciant succi unde nutriantur. Quam ob rem veluti si ri-  
 ramulus intercipiatur, aqua labitur copiosior per alios, &  
 arteria circumligetur, fluit sanguis uberius per vicinas  
 riolas, easque sensim dilatat, ita cum compressio labi  
 in septum per ejus vasa parum aut nihil humoris; hic hu-  
 sibi viam facit per arteriolas, quæ per reliquum ossis diffu-  
 nantur.

Nunc dum mecum reputo quanta celeritate ossa or-  
 in hisce animantibus augentur & indurescunt, dumque  
 mum adverto ossibus, de quibus agimus, copiosius alimen-  
 suppeditari, mihi videor rationem jam intelligere cur sep-  
 parum, aut nihil altum deinceps valde extenuetur in dies  
 gis magisque, interim dum reliquæ ossis partes plurimum  
 lescent; quæ sane interea dum adolescunt, & secundum  
 nes dimensiones crescendo cavum, quod comprehendunt,  
 plificant, non ne consequi videtur ut septum adeo simul  
 tenuatum distrahant, ita quidem ut ejus fibræ utrisque  
 nitæ medullis disiungantur, atque in retis speciem conform-  
 tur; quod rete magis deinde ab eadem causa rarefactum  
 dem in media ossis parte fere totum oblitteretur? Ratio e-  
 cur integrum servetur adhuc septum ad utrasque ossis extr-  
 tates etiam in ariete, si quid judico, profecto inde peti-  
 test quod spongiosa in ea parte sit ossis substantia, atque  
 ibi loci quam diximus compressio, & quæ ab ipsa sequun-  
 cum iis, quæ in medio osse fiunt, nequaquam comparantur.

Atque ut hæc, quæ hætenus conjectura profecutus sum  
 magis comprobarem, præsto jam essent ex ipso humano  
 pore exempla desumta, & quidem plura; sed nonnulla  
 tum in medium afferam.

Quod enim corporis partes, quæ in contactu sunt  
 premuntur, in unum concrecant, ostendit pericardium,  
 diaphragmati semper adhærens, ita nexu indissolubili cum  
 cohæret, ut pars a parte non amplius distingui possit  
 separari.

Quod vero ad ipsamet ossa pertinet, quis mihi p-  
 contactum & pressionem, probabiliorem dederit ratio-



quare epiphyfes, quando offeæ factæ sunt, ossibus coalescant? Quæ sane res in rusticis omnibusque iis, qui vitam vivunt laboriosam, citissime fieri observatur; contra in sequiori sexu fæminatisque viris tardissime, & non raro nunquam.

Quod autem ex ossis distractione ejus interna pars cellulosa fiat & reticularis, ex eo intelligi potest, quod in bajulis, & in iis, qui maximis nixibus victum quæritant, tanta sit musculi sternomastoidei potentia trahens, ut processus mammillares magis in illis excrescant, atque intus in plures cellulas abeant, quam in fœminis, & minus exercitatis.

Quod si forte ex me quærat aliquis, quid factum fuerit quibus illis periostei laminis, quæ inter utrumque os torqueantur; Clariss. Anatomicorum sequens sententiam, respondebo, periosteon non secus ac simplex membrana omnia ossa & cartilagines immediate circumambire, ad eum modum quo pleura, & peritoneon circumambiunt viscera pectoris, & iminentis, & quo dissimiles quæque corporis partes discernuntur a tela cellulari, cum non nisi ex hac ipsa tela plus minusve constipata membranæ constare videantur. Quamvis enim periosteon filis tenuioribus, & subtiliori opere contextum appareat, id fortasse lævi ossium superficiei, cui aptatur, & perpetuæ ossium resistentiæ, & musculorum tendinumque pressio debetur. Opinor igitur duas periostei portiones constrictas inter septi laminas incredibilem in modum extenuari debere, ita ut ab fibrarum septi disunctione ipsæ quoque disjungantur, & abeant in telam cellulosam primigeniam, quæ cum cellulosa cavi commisceatur.

Hæc habui quæ super Clar. Foucherousii observationibus pro viribus animadversa, & cogitata gravissimo judicio vestro objicerem. Quod autem voluerit natura ut ex duobus ossa, de quibus sermo fuit, in unum concreverent, aut fallor, aut dicere non est qui possit, neque eam rationem reddere dictis. „



[illegible]

*[The page contains faint, illegible handwritten text.]*

*[Faint, illegible handwriting]*

[illegible]